

Στάρι της άνοιξης

Οι ανοιξιάτικες σπορές σταριού προκόβουν σε δροσερά μέρη (ορεινά) και σε χωράφια πλούσια και υγρά που αν τα έσπερναν το φθινόπωρο θα πλάγιαζαν και θα σάπιζε ο σπόρος από την περίσσεια υγρασία.

Μπορούν να σπαρθούν τέλος Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου και έχουν μικρότερη απόδοση σε καρπό και άχυρο από τα στάρια που σπέρνονται το φθινόπωρο. Εν τούτοις η ποικιλία **διμηνίτης** ή **τριμήνι** ή **μαρτάκι** πλησιάζει τις αποδόσεις των φθινοπωρινών σπορών. Μεστώνει 2 έως 3 εβδομάδες αργότερα από τα φθινοπωρινά στάρια. Δεν αδελφώνει καλά γι αυτό σπέρνουμε περισσότερο σπόρο ανά στρέμμα.

Σμίγος ή σμιγάδι ή μιγάδι ή σταροκρίθι

Σπέρνεται στα φτωχά χωράφια των ορεινών περιοχών. Στα πεδινά δεν σπέρνουμε το σμιγάδι γιατί το κριθάρι που είναι πρωϊμότερο θα έπνιγε το στάρι.

Ο σμίγος καλλιεργείται για να εξουδετερώσει τις ζημιές από την ξηρασία. Όταν η χρονιά βγει ξερική το κριθάρι οπωσδήποτε θα αποδώσει και θα πάρουμε παραγωγή κριθαριού. Αν πάλι βρέξει θα αποδώσει το σιτάρι και θα έχουμε πλούσια συγκομιδή σταριού.

Ο σπόρος που σπέρνουμε δεν προέρχεται από το μιγάδι αλλά από ξεχωριστές ποικιλίες σταριού και κριθαριού που τις επιλέγουμε για τον τόπο που καλλιεργούμε.

Το ψωμί από το αλεύρι του σμίγου είναι γλυκό και τα παξιμάδια εξαιρετικά.